Megoldási javaslatok
hajtatott uborka
fuzáriumos hervadása ellen



For Defense™

A hajtatott uborka fuzáriumos hervadása régóta jelen van Magyarországon, az elmúlt két szezon során azonban az esetek száma és a kártétel mértéke is jelentősen növekedett.

Az oltás hatékony megelőzési lehetőséget jelent a fuzárium okozta veszteségek csökkentésére.

*Fuzáriummal veszélyeztetett kertészetben **az oltás** a termesztés biztosításának egyik legfontosabb eszköze.*

Ugyanakkor kevésbé köztudott, hogy uborkában – a paradicsommal ellentétben – az oltás nem jelent automatikus hozam növekedést, sőt az oltott növények hozama általában elmarad a nem oltott növényekétől. Bár az ebből adódó kiesés még mindig kisebb, mint amekkora veszteség egy fuzáriummal fertőzött állományban jelentkezhet.

Szakmai ismereteink és tapasztalataink szerint az oltással együtt járó növekedési erély- és hozam csökkenés megfelelő alanyválasztással elkerülhető.

A Rijk Zwaan a **Combyne RZ F1** alany használatát javasolja, amely a termesztett uborkával botanikailag megegyezik (Cucumis sativus), ezáltal kedvező kompatibilitást biztosít a nemes fajtával.

A **Combyne RZ F1** alanyra oltott növények teljes mértékben megőrzik a nemes fajta jellegét. Az erre oltott állományokban nem tapasztalható hozamcsökkenés és a növények eredeti növekedési erélye is megmarad. Ezt a kedvező tulajdonságot a hazai és nemzetközi tapasztalataink, kísérleteink eredményei is alátámasztják. Ennek oka minden bizonnyal a jobb kompatibiltás a más típusú alany fajtákhoz képest.
Azoknak a kertészeteknek, amelyek a jövőben is oltott növényekkel kívánnak dolgozni, mindenképpen a **Combyne RZ F1** alkalmazását javasoljuk. Érdemes ugyanakkor számításba venni a hasonló tulajdonságokkal rendelkező **Fortyne RZ F1** alanyt is, amely a fuzárium mellett CGMMV ellenállóképességgel is rendelkezik.

Mindkét alany rezisztens a pítiumos hervadásra is, ez elsősorban a meleg időszakokban ültetett állományokban nyújthat megoldást.

A kockázatok mérsékléséhez alanyok használata mellett is elengedhetetlen a szigorú higiénia, a termesztőközeg rendszeres cseréje, valamint a *Pythium spp* elleni bevált technológiák alkalmazása: ilyen lehet például a megfelelő növényvédelmi kezelés, illetve a közeg hőmérsékletének 26 °C alatt tartása a kiültetést követő első hetekben.

Az oltás mellett a fuzáriummal szemben ellenálló nemes kígyóuborka fajták alkalmazása is hatékony megoldást jelenthet.

A **Forami RZ F1 és a Fordor RZ F1** jól bevált, megbízható hibridek, amelyek évek óta eredményesen szerepelnek a hazai kertészetekben. Elsősorban a hagyományos, ernyős művelési módhoz ajánljuk őket, ugyanakkor a Fordor RZ F1 nyári főszáras termesztésével kapcsolatban is kedvező tapasztalatokkal rendelkezünk.

Részletes termesztési ajánlásért és a körülményekhez legjobban illeszkedő fajtaválasztásért **keresse bizalommal high-tech hajtatási termékfelelősünket vagy területi képviselő kollégáinkat!**



Tornyai Tibor Tel: +36 309247030 email: t.tornyai@rijkzwaan.hu

RIJK ZWAAN
Rijk Zwaan Budapest Kft.
Budapest, 1016
Aladár utca 17-19.
Tel: +36 1 4898060
info@rijkzwaan.hu
www.rijkzwaan.hu

Fuzárium-rezisztens alanyaink
Hajtatott uborka



Combyne RZ For Defense™

Középerős növekedési erélyű uborka alany hidrokultúrás termesztéshez. A rá oltott nemes fajta megőrzi eredeti tulajdonságait, az állomány egyenletes és egészséges lesz. Pítium és fuzárium ellenálló.

Rezisztencia: **IR**: For/Pa/Px

Fortyne RZ For Defense™

Erős növekedési erélyű uborka alany hidrokultúrás termesztéshez. Pítium és fuzárium rezisztens alany, mely a CGMMV-vel szemben is ellenállóságot mutat.

Rezisztencia: **HR**: Ccu **IR**: CVYV/For/Pa

Fuzárium-rezisztens fajtáink
Hajtatott uborka





Forami RZ F1 For Defense™ Blue Leaf™

For Defense™, azaz fuzárium rezisztens nemes fajta. Blue Leaf™ típusú, ennek köszönhetően kimagasló az általános stressz- és hőtűrése, valamint növényvédelmi szempontból is ellenállóbb. Növekedési erélye nagy, levélzete kékes-zöld. Ültetését február végétől augusztus első dekádjáig javasoljuk ernyős művelési módra. A termések sötét árnyalatúak, 32-36 cm hosszúak, szép formájúak.

Rezisztencia: **HR**: Cca/Ccu és **IR**: CMV/CVYV/For/Px

Fordor RZ F1 For Defense™ Blue Leaf™

For Defense™ és Blue Leaf™ nemes fajta, kiváló stressz- és hőtűrés jellemzi. A Forami RZ magasabb fokú lisztharmat rezisztenciával rendelkező alternatívája. Növekedési erélye valamivel kisebb, mint a Forami RZ fajtáé. Ültetését március elejétől július végéig javasoljuk elsősorban ernyős művelési módra, de főszáras termesztésben is használható. A termések hossza átlagosan 30-34 cm

Rezisztencia: **HR**: Cca/Ccu/Px és **IR**: CVYV/For

Tudjon meg többet a ForDefense termékvonalról!

RIJK ZWAAN