

厚皮甜瓜优良品种——34-140 RZ F1

来源：冯建云 编辑：rz 发布：2014-05-22

特征特性：中早熟黄皮绿肉甜瓜，果皮略有一点皱，果实发育期 45 天。植株生长势健壮，抗病性强。极易坐果，果实椭圆，果皮黄色，淡绿肉，果肉厚 3.5 厘米左右。果实整齐，肉质脆甜爽口，果味清香，口感好，中心可溶性固形物含量 13% 左右，平均单瓜重 1.5 千克左右，最重可达 1.8 千克，折合亩产（2000 株/亩）3000 千克。果实不脱落，施用农药少，极易栽培。

栽培要点：设施春季立架栽培，应尽量避免重茬种植。播种期与当地甜瓜生产播期相同。育苗苗龄 30~35 天后 4 叶 1 心期定植，每亩栽培 1600~1800 株。定植后密闭棚室，保持温度白天 28-32℃，夜间 18-20℃；缓苗后到雌花开放前白天 25-32℃，夜间 14-16℃；开花坐果期白天 25-30℃，夜间 15-18℃；果实生长期白天 28-32℃，夜间 16-18℃。达到高温时，要放风降温排湿，当温度降到所需温度低点时，要关风口保温。随外界气温升高逐步加大放风量，夜间温度超过 18℃ 时，也可放风，保持相对湿度 60%-70%。采用单蔓整枝，在主蔓第 12~15 节留坐果枝，人工辅助授粉，1 蔓留 1 瓜，并于瓜前留 2 片叶摘心，将瓜与子蔓用绳吊在横条上，以免坠秧，坐瓜以下子蔓全部摘掉，主蔓第 25~30 节打顶。注意重施底肥，以优质有机肥为主，配合适量磷钾肥，在果实膨大期要保证水肥充足，增施优质钾肥，采收前 5~10 天停止浇水，以提高甜瓜品质。

适宜区域：适宜于北京、山东、河北、河南等地设施春季栽培，以及陕西、甘肃、内蒙古等西北地区设施或露地栽培。

