



RIJK ZWAAN



Bio

Semences potagères biologiques et non traitées

Gamme pour professionnels
Disponibilités au 1^{er} janvier 2026

Le Bio par Rijk Zwaan

Un engagement Bio depuis 1992

Rijk Zwaan propose une large gamme de semences certifiées **ECOCERT FR-BIO-01**, conformes aux standards européens et français de l'agriculture biologique.

Le Bio dès la sélection

Nos équipes intègrent les exigences du bio dès les premières étapes de la sélection. Nos variétés sont minutieusement testées en conditions réelles dans plusieurs pays, pour évaluer leur performance et ainsi garantir des solutions pertinentes et durables.

L'innovation au service du Bio



30 % de notre chiffre d'affaires est investi en R&D pour développer des variétés intégrant les derniers progrès en matière de résistances, de robustesse, de qualité gustative et de durée de conservation, adaptées aux besoins de l'ensemble des acteurs de la filière et aux attentes des consommateurs.

Certificat ECOCERT 2024-2026

Disponible sur www.rijkszwaan.fr



Légende

-  Semences non traitées, sous réserve de disponibilité
-  Semences biologiques, sous réserve de disponibilité


LAITUES PLEIN CHAMP

Positionnement

Batavia blonde | rouge

Nord France

Sud France

Decision RZ  HR: BL:29-37,40,41EU/Nr:0
IR: LMV:1


Fin de printemps | Été
Début d'automne

Kovalski RZ  HR: BL:29-41EU/Nr:0
81-BA8781 IR: Fol:1,4

Fin de printemps | Été
Début d'automne

Bartal RZ  HR: BL:29-41EU/Nr:0
81-BA5005 IR: LMV:1/Rs/Fol:1,4

Printemps
Automne


Marinski RZ  HR: BL:29-36,38-41EU/Nr:0
IR: Fol:1,4

Printemps | Été
Automne

Feuille de chêne blonde | rouge

Nord France

Sud France

Kiden RZ  HR: BL:29-41EU/Fol:1,4/Nr:0
IR: LMV:1/Rs

Été

Été

Kiley RZ  HR: BL:29-41EU/Nr:0
IR: LMV:1/Fol:4


Printemps | Été
Automne

Printemps
Automne

Aramai RZ  HR: BL:29-41EU/Nr:0
IR: LMV:1

Printemps | Été
Automne

Printemps
Automne

Dakarai RZ  HR: BL:29-41EU/Fol:4/Nr:0
IR: LMV:1


Fin de printemps
Été
Début d'automne

Printemps
Automne


Laitue pommée blonde | rouge

Nord France

Sud France

Abellina RZ  HR: BL:29-41EU/Fol:1,4/Nr:0
IR: LMV:1/Rs

Fin de printemps
Été
Début d'automne

Transpero RZ  HR: BL:29-41EU/Fol:4/Nr:0
IR: LMV:1/Fol:1

Printemps
Automne

Burette RZ  HR: BL:29-41EU/Nr:0
43-BU5426 IR: LMV:1


Printemps | Été
Automne

Printemps
Automne

Romaine

Nord France

Sud France

Rawonder RZ  HR: BL:29-41EU/Fol:1,4/Nr:0
IR: LMV:1

Printemps | Été
Automne

Printemps
Automne

Rougette

Nord France

Sud France

Antaine RZ  HR: BL:29-41EU/Nr:0
IR: LMV:1

Printemps | Été
Automne

LAITUES DE SERRE

Positionnement

Batavia blonde | rouge

Nord France

Sud France


Barnabie RZ  HR: BL:29-41EU
IR: Fol:4

Automne
Printemps

Nolanie RZ  HR: BL:29-41EU/Nr:0

Automne
Printemps

Automne
Printemps | Hiver*

Marinski RZ  HR: BL:29-36,38-41EU/Nr:0
IR: Fol:1,4

Automne
Printemps

LAITUES SERRE

Positionnement

Feuille de chêne **rouge**

Nord France

Sud France

Belesai RZ



HR: Bl:29-41EU/Fol:4/Nr:0

Hiver
Printemps

Calibai RZ



HR: Bl:29-41EU/Fol:4/Nr:0

Automne
Printemps

Laitue pommée blonde | **rouge**

Nord France

Sud France

Gambetta RZ



HR: Bl:29-41EU
IR: Fol:4

Automne
Printemps

Automne
Printemps | Hiver*

Gilmore RZ



HR: Bl:29-37,39-41EU

Automne | Hiver
Printemps

Romaine

Nord France

Sud France

Rawonder RZ



HR: Bl:29-41EU/Fol:1,4/Nr:0
IR: LMV:1

Automne | Hiver
Printemps

CHICORÉE

Positionnement

Chicorée scarole

Anconi RZ



Été
Début d'automne

Chicorée frisée

Monaco RZ



Hiver

ENDIVE BLANCHE

Positionnement

Tobix RZ



Forçage de décembre à mars

ÉPINARD⁽¹⁾

Positionnement

Eland RZ F1



HR: Pe:1-15,17,20
IR: Pe:16,18,19

Hiver

Nasua RZ F1



HR: Pe:1-9,11-16,18-20
IR: Pe:10,17

Hiver

Platypus RZ F1



HR: Pe:1-15,17,20

Hiver

Boxfish RZ F1



HR: Pe:1-19
IR: Pe:20

Intermédiaire

Kodiak RZ F1



HR: Pe:1-20

Intermédiaire

Timberwolf RZ F1



HR: CMV/Pe:1-19
IR: Pe:20

Intermédiaire

Rattler RZ F1



HR: Pe:1-15,17,18,20
IR: Pe:16,19

Été
















Yakalo RZ F1



HR: Pe:1-3,5-19
IR: Pe:4







Été

*Hiver en conditions peu gélives








ROQUETTE		Positionnement
Nereid RZ	 IR: Hp	Printemps Été Automne
Diomedes RZ	 IR: Hp	Printemps Été Automne
SWISS CHARD		Positionnement
Charbell RZ	 IR: Cb	Été
Charlie RZ	 IR: Cb	Ensemble de la saison
Charsano RZ	 IR: Cb	Ensemble de la saison
TOMATE		Intérêts
Ronde vrac		
Gloriette RZ F1	 HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf:A-E/Va:0/Vd:0 IR: TSWV/Ma/Mi/Mj	Culture sous abri
Gerdicia RZ F1	 HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pf:A-F,H/Va:0/Vd:0 IR: Pn	Culture sous abri Calibre intermédiaire
AUBERGINE		Positionnement
Ovoïde striée		
Angela RZ F1	 NT	Ensemble de la saison
Lydia RZ F1	 NT	Ensemble de la saison
Ovoïde noire		
Monarca RZ F1	 NT	Ensemble de la saison
PORTE-GREFFE SOLANACÉE		Intérêts
Emperador RZ F1	 HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0 IR: Ma/Mi/Mj	Compatible tomate et aubergine
Embajador RZ F1	 HR: ToMV:0-2/Fol:0-2/For/Pl/Va:0/Vd:0 IR: Ma/Mi/Mj	Compatible tomate et aubergine
POIVRON		Intérêts
Redwing RZ F1	 HR: Tm:0-2 IR: TSWV:0/Lt	Culture sous abri
<i>Vert-rouge</i>		
Alzamora RZ F1	 HR: PVY:0,1,1,2/Tm:0-3 IR: CMV	Culture sous abri
<i>Vert-rouge</i>		
Hatrick RZ F1	 HR: Tm:0-3	Culture sous abri
35-243		
<i>Jaune</i>		

⁽¹⁾L'ensemble des variétés d'Épinard, Melon, Chou et Chou-fleur sont également disponibles en semences non traitées. Retrouvez tout notre assortiment sur notre site internet.

MELON CHARENTAIS⁽¹⁾**Positionnement**

Thorens RZ F1		HR: Fom: 0, 1, 2 IR: Px:2, 5, 3.5/Ag	Sud-est et Centre-ouest Chenilles Bâches
Imanoa RZ F1		HR: Fom: 0, 1, 2 IR: Fom:1.2/Px: 2, 5/Ag	Centre-ouest Chenilles Bâches
Etchabi RZ F1		HR: Fom: 0, 1, 2 IR: Fom:1.2/Px: 2, 5/Ag	Sud-est Chenilles Bâches
Allegreto RZ F1		HR: Fom: 0, 1 IR: Px:2, 5, 3.5/Ag	Centre-ouest, Sud-ouest Bâches Plein champ
Iollisco RZ F1		HR: Fom: 0, 1, 2 IR: Px:2, 5/Ag	Sud-est Bâches Plein champ
Oskari RZ F1		HR: Fom: 0, 1, 2 IR: Fom:1.2/Px: 2, 5, 3.5/Ag	Centre-ouest Plein champ tardif


CONCOMBRE**Positionnement**

Concombre long			Nord France	Sud France
Diapason RZ F1		HR: Cca/Ccu/Px IR: CMV/CVYV		Fin de printemps Été Automne
Verdon RZ F1		HR: CGMMV/Cca/Ccu/Px IR: CMV/CVYV	Été Automne	
Aramon RZ F1		HR: Cca/Ccu/Px		Été Automne
Insula RZ F1		HR: CGMMV/Cca/Ccu/Px IR: CMV/CVYV/CYSDV		Printemps Été
Bluesummer RZ F1		HR: CGMMV/Cca/Ccu/Px IR: CABYV/CMV/CVYV		Été
Proloog RZ F1		HR: Cca/Ccu IR: Px		Printemps
Concombre court épineux			Nord France	Sud France
Caman RZ F1		HR: Ccu/Px IR: CMV/CVYV		Ensemble de la saison

CHOU-RAVE**Positionnement**

Lech RZ F1			Été Automne
-------------------	---	--	----------------------

CÉLERI BRANCHE VERT**Positionnement**

Imperial RZ F1			Fin d'été Automne
Kelvin RZ F1			Fin de printemps Été Automne
Tejal RZ F1			Fin d'hiver Printemps

CÉLERI RAVE

Positionnement

Merga RZ F1  ⁽²⁾

Fin de printemps | Été | Automne

CHOU POMMÉ ROUGE⁽¹⁾

Positionnement

Futurima RZ F1 

Automne | Hiver

CHOU DE MILAN⁽¹⁾

Positionnement

Madlene RZ F1  HR: Foc:1

Fin d'été | Début automne

CHOU POMMÉ BLANC⁽¹⁾

Positionnement

Kalorama RZ F1 

Automne | Hiver

Mucsuma RZ F1  HR: Foc:1

Hiver | Conservation longue

⁽¹⁾L'ensemble des variétés d'Épinard, Melon, Chou et Chou-fleur sont également disponibles en semences non traitées. Retrouvez tout notre assortiment sur notre site internet.

⁽²⁾Semences biologiques disponibles en février 2026

Codification des résistances

HR High resistance | Résistance haute

IR Intermediate resistance | Résistance intermédiaire

LAITUE

LMV Lettuce Mosaic Virus | Virus de la mosaïque de la laitue

Rs *Rhizorhapis suberifaciens* | Corky root

Bl *Bremia lactucae* | Mildiou de la laitue

FoI *Fusarium oxysporum f. sp. lactucae* | Fusariose vasculaire de la laitue races 1 et 4

Nr *Nasonovia ribisnigri* biotype 0 | Pucerons

Cb *Cercospora beticola* | Cercosporiose

ÉPINARD

Pe *Peronospora effusa (ex Pfs)* | Mildiou de l'épinard

ROQUETTE

Hp *Hyaloperonospora parasitica* | Mildiou de la roquette

CONCOMBRE

Cca *Corynespora cassiicola* | Corynesporiose

Ccu *Cladosporium cucumerinum* | Cladosporiose

Px *Podophaga xanthii* | Oïdium

Gc *Golovinomyces cichoracearum* race 1 (ex *Erysiphe cichoracearum*) | Oïdium

CABYV Cucurbit aphid-borne yellows virus | Virus de la jaunisse des cucurbitacées

CGMMV Cucumber Green Mild Mottle Virus | Virus de la marbrure du concombre

CMV Cucumber mosaic virus | Virus de la mosaïque du concombre

CVYV Cucumber vein yellowing virus | Virus du jaunissement des nervures du concombre

CYSDV Cucumber yellow stunting disorder virus | Virus du jaunissement et du rougrissement du concombre

ToLCNDV Tomato leaf curl New Delhi virus | Virus New Delhi des feuilles enroulées de la tomate

MELON

Fom: 0,1,2,12 *Fusarium oxysporum f. sp. melonis* races 0, 1, 2 & 12 | Fusarioses vasculaires du melon

Px: 2, 5, 3,5 *Podospaera xanthii* | Oïdium

Ag *Aphis gossypii* | Puceron du cotonnier

POIVRON

Tm:0,1,2,3 Tobacco mosaic virus races P0, P1, P1.2, P1.3 | Virus de la mosaïque du tabac

TSWV Tomato spotted wilt virus | Virus de la maladie bronzée de la tomate

Lt *Leveillula taurica* | Oïdium

TOMATE

ToMV:0,1,2 Tomato mosaic virus races 0,1,2 | Virus de la mosaïque de la tomate

TSWV Tomato spotted wilt virus | Virus de la maladie bronzée de la tomate

Pf:A-E *Passalora fulva (ex Fulvia fulva)* races A, B, C, D, E | Cladosporiose

FoI:0,1,2 *Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici* races 0,1,2 | Fusariose vasculaire de la tomate

Va:0 *Verticillium albo-atrum* | Verticilliose

Vd:0 *Verticillium dahliae* | Verticilliose

Ma *Meloidogyne arenaria* | Nématodes à galles (galles racinaires)

Mi *Meloidogyne incognita* | Nématodes à galles (galles racinaires)

Mj *Meloidogyne javanica* | Nématodes à galles (galles racinaires)

Pn (ex On) *Pseudoidium neolyopersici (ex Oidium neolyopersici)* | Oïdium

CHOU

Foc:1 *Fusarium oxysporum f. sp. Conglutinans* | Fusariose vasculaire

Xcc *Xanthomonas campestris pv. campestris* | Nervation noire du chou

Document imprimé à partir d'encre végétales sur papier certifié FSC®



MENTIONS LÉGALES

Ce document est destiné aux seuls professionnels de la production légumière. Pour nos conditions générales de vente et pour la définition des termes de résistances, nous vous prions de vous référer à notre site Internet www.rijkszwaan.fr ou alors à nos documents tarifs.

Les descriptions, les illustrations, les conseils de culture et toute autre information de Rijk Zwaan dans quelque forme que ce soit, par exemple sur les dates de péremption, les semis, les plantations et périodes de récoltes sont basés aussi précisément que possible sur les expériences acquises en pratique dans les essais. Cependant Rijk Zwaan n'accepte en aucun cas une responsabilité pour des dommages qui résulteraient de l'utilisation de telles descriptions, illustrations, conseils de cultures et autres informations. L'acheteur et/ou l'utilisateur sont eux-mêmes responsables pour le stockage des semences et considéreront si les variétés et les conseils de culture sont adaptés à leurs conditions locales de cultures.

Les photos présentes sur nos catalogues et nos tarifs montrent les types auxquels les variétés mentionnées appartiennent et non pas les variétés elles mêmes. Ces photos ne constituent aucune garantie de performance, ni explicite ni implicite.

La mention d'une variété dans cette édition n'implique pas automatiquement qu'elle soit disponible à des fins commerciales; les semences peuvent être indisponibles ou disponibles uniquement pour essai. Pour plus d'informations, veuillez contacter Rijk Zwaan (www.rijkszwaan.com).